

**REAÇÕES ADVERSAS:**

Quando utilizado conforme as recomendações do fabricante, o produto não provoca reações adversas.

**PERÍODO DE CARÊNCIA:** Este produto dispensa período de carência.

**APRESENTAÇÃO:**

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 mL.

Conservar o produto ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 15°C e 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO  
DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e  
Abastecimento sob o nº SP 000211-9.000004 em 01/08/2016.  
Responsável Técnico: Dr. José Antonio Dell'Aqua Junior  
Médico-veterinário CRMV/SP 11.220.

**Proprietário e Fabricante:**

BOTUPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
R. Coronel Fonseca, 2.111 – Jd Bom Pastor  
Botucatu/SP - CEP: 18.603-495  
CNPJ: 11.195.056/0001-65 Ins. Estadual: 224.197.376.119  
Fone: (14) 3112-9900 Fax: (14) 3112-9904  
www.botupharma.com vendas@botupharma.com.br  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Partida nº e Data de Fabricação:

Vide carimbo aplicado no cartucho e no rótulo do frasco.

Data do vencimento:

02 (dois) anos após a data de fabricação.

MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO



**17 BETA**  
17β Estradiol injetável

  
**Botupharma**  
Escolha inteligente.

# 17 BETA

17 $\beta$  Estradiol injetável



## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

17  $\beta$  estradiol ..... 10 mg

Veículo q.s.p..... 1 mL

### INDICAÇÕES:

17 beta é um estrogênio bioidêntico ao fisiológico, indicado para indução de sinais de estro em fêmeas equinas.

### VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular profunda.

### MODO DE USAR:

Aplicar por via intramuscular profunda em éguas na dosagem de 1 a 2 mL (10 a 20 mg).

### PROTOCOLO RECOMENDADO:

Preparação de receptoras em anestro ou transição para transferência de embrião (T.E.)

D - 3 = Dia da ovulação da doadora

D - 3	D - 2	D - 1	D0	D3 a D7
1 mL (17 beta)	2 mL (17 beta)	1 mL (17 beta)	P4-300 ou Altrengeest	T.E.*

\* No dia da T.E. reaplicar a P4-300 ou Altrengeest.

D= Dia

A dose e o protocolo de utilização poderão ser modificados a critério do Médico Veterinário.

### CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

O produto não deve ser utilizado em animais pré-púberes.

Utilizar dentro do prazo de validade.

Não aplicar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

### CUIDADOS E PRECAUÇÕES NO USO:

O produto deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante.

Utilizar sempre agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.