

REAÇÕES ADVERSAS:

Quando utilizado conforme as recomendações do fabricante, o produto não provoca reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Determinados antibióticos, como a rifampicina, podem alterar o metabolismo hepático da progesterona, reduzindo a eficácia do produto.

PERÍODO DE CARÊNCIA: Este produto dispensa período de carência.

APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 100 mL.

Conservar o produto ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 15°C e 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000211-9.000003 em 01/08/2016.
Responsável Técnico: Dr. José Antonio Dell'Aqua Júnior
Médico Veterinário CRMV/SP 11.220.

Proprietário e Fabricante:

BOTUPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
R. Coronel Fonseca, 2.111 – Jd Bom Pastor
Botucatu/SP - CEP: 18.603-495
CNPJ: 11.195.056/0001-65 Ins. Estadual: 224.197.376.119
Fone: (14) 3112-9900
www.botupharma.com.br vendas@botupharma.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Partida nº e Data de Fabricação:
Vide carimbo aplicado no cartucho e no rótulo do frasco.

Data do vencimento:
02 (dois) anos após a data de fabricação.

MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO

P4-300[®]
Progesterona injetável


Botupharma[®]
Escolha inteligente.

P4-300

Progesterona injetável



USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Progesterona.....300 mg

Veículo q.s.p.....1 mL

INDICAÇÕES:

P4-300 é uma progesterona natural de longa ação indicado para fêmeas equinas na preparação de receptoras de embrião acíclicas ou para manutenção da gestação.

VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular profunda.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Aplicar por via intramuscular profunda 5 mL (1.500 mg) a cada 7 dias ou 10 mL (3.000 mg) a cada 14 dias para manutenção da prenhez.

INTERVALO ENTRE DOSES E DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

Normalmente sua administração é feita a cada 7 dias, quando se utiliza 5 mL do produto e a cada 14 dias na utilização de 10 mL. Esse protocolo pode ser modificado a critério do Médico Veterinário. Nos casos onde o produto é utilizado para manutenção da gestação em éguas acíclicas, recomenda-se reaplicações até 120 dias de prenhez.

CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

O produto não deve ser utilizado em animais pré-púberes. Utilizar dentro do prazo de validade. Não aplicar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES NO USO:

O produto deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante. Utilizar sempre agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.