

### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Quando utilizado conforme as recomendações do fabricante, o produto não provoca reações adversas.

**PERÍODO DE CARÊNCIA:** Este produto dispensa período de carência.

### **APRESENTAÇÕES:**

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 10 mL. Display contendo 25 frascos-ampola de vidro âmbar contendo 10 mL cada.

Transporte do produto em temperatura até 25°C. Conservar o produto sob refrigeração com temperaturas entre 2°C e 8°C. Manter ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000211-9.000002 em 01/08/2016.  
Responsável Técnico: Dr. José Antonio Dell'Aqua Junior  
Médico Veterinário CRMV/SP 11.220

### **Proprietário e Fabricante:**

BOTUPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
R. Coronel Fonseca, 2.111 – Jd Bom Pastor  
Botucatu/SP - CEP: 18.603-495  
CNPJ: 11.195.056/0001-65 Ins. Estadual: 224.197.376.119  
Fone: (14) 3112-9900 Fax: (14) 3112-9904  
www.botupharma.com.br vendas@botupharma.com.br  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Partida nº e Data de Fabricação:

Vide carimbo aplicado no cartucho e no rótulo do frasco.

Data do vencimento:

02 (dois) anos após a data de fabricação.

MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO



**STRELIN<sup>®</sup>**  
Histrelina Injetável

  
**Botupharma**  
Escolha inteligente.

# STRELIN<sup>®</sup>

Histrelina Injetável



## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Histrelina Acetato .....250 µg

Veículo q.s.p.....1 mL

### INDICAÇÕES:

STRELIN<sup>®</sup> é um potente análogo sintético do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas). É indicado para a indução e sincronização da ovulação em éguas.

### VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular.

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

STRELIN deve ser aplicado em éguas apresentando folículos ovarianos iguais ou maiores que 33 mm de diâmetro, determinado por palpação transretal e ultrassonografia, na dose única de 1 mL (250 µg). Nos períodos de início e final de estação de monta, a dose pode ser dobrada (2 mL - 500 µg) a critério do Médico Veterinário, para maior eficiência do produto.

### INTERVALO ENTRE DOSES E DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

Não existe um intervalo rigorosamente definido para a reaplicação do produto. Normalmente sua administração é feita em dose única. Sua reaplicação está condicionada a uma decisão tomada pelo Médico Veterinário responsável pelo diagnóstico, prescrição e acompanhamento do animal em tratamento.

### CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

Este produto é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Aplicações repetidas em curto intervalo de tempo podem causar inibição de gonadotrofinas pela hipófise. Utilizar dentro do prazo de validade.

### CUIDADOS E PRECAUÇÕES NO USO:

O produto deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante. Utilizar sempre agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.